

نامکمل

# اسقاطِ حمل کے علاج کیلئے ماتر و پروسٹول کی گولیوں کا استعمال

زبان کے نیچے رکھ کر



National Committee for  
Maternal & Neonatal Health



زبان کے نیچے رکھ کر

## مائزوپروسٹول کی گولیوں سے نامکمل اسقاطِ حمل کا علاج

اگر آپ کا اسقاطِ حمل نامکمل ہو، تو آپ کا مائزوپروسٹول کی گولیوں سے بحفاظت اور مؤثر طریقے سے علاج ہو سکتا ہے۔ یہ گولیاں دو طریقوں سے استعمال کی جاسکتی ہیں، یا تو منہ کے ذریعے نگل کر یا پھر زبان کے نیچے رکھ کر۔



## مائزوپروسٹول کی گولیاں کیسے لی جائیں؟ (زبان کے نیچے رکھ کر)

مائزوپروسٹول کی دو گولیاں (400 mcg) زبان کے نیچے رکھیں۔ گولیوں کو اس وقت تک زبان کے نیچے رکھیں جب تک کہ وہ گھل نہ جائیں، یا آدھے گھنٹے تک رکھنے کے بعد جو کچھ باقی رہ جائے اُسے پانی سے نگل لیں۔



00:30

## گولیاں لینے کے بعد کیا ہوگا؟

مازوپروسٹول رحم کو سیٹھرتی ہے۔ تولیدی راستے (وجائنا) سے کچھ خون آئے گا اور پیٹ میں مروڑ/ درد ہوگا۔ کچھ خون کے جھے ہوئے ٹکڑے بھی خارج ہو سکتے ہیں۔



پیٹ میں مروڑ/ درد



خون جاری ہونا

## بہت ساری عورتوں کو ضمنی اثرات نہیں ہوتے

کچھ عورتوں کو بخار، سردی، متلی، الٹی یا دست ہو سکتے ہیں۔ یہ علامات ایک دن میں خود ہی ٹھیک ہو جائیں گی۔



دست آنا



متلی اور قے آنا



کپکپی/ سردی لگنا/ بخار ہونا

## ضمنی اثرات سے کیسے نمٹا جائے؟

پیٹ میں مروڑ/ درد کیلئے درد کم کرنے کی دوا لی جاسکتی ہے۔ بخار کیلئے دوا کی عام طور پر ضرورت نہیں ہوتی، زیادہ پانی پینے اور آرام کرنے سے بھی مدد ملتی ہے۔ زیادہ تر ضمنی اثرات تھوڑی دیر بعد خود ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔



## آپ کو صحت کے کارکن سے کب مدد لیننی چاہیے؟

درج ذیل میں سے کسی بھی علامت کے ظاہر ہونے کی صورت میں آپ کو فوری مدد لیننی چاہیے:



زیادہ خون کا جاری ہونا

بہت زیادہ خون آ رہا ہو: جس سے ہر ایک گھنٹے میں 2 سے زیادہ بینیری پیڈز/ کپڑے خون سے بھر جائیں اور یہ عمل 2 گھنٹے تک لگاتار جاری رہے، خاص طور پر اگر اس کے ساتھ چکر اور بہت زیادہ تھکن بھی ہو۔



پیٹ میں مستقل مروڑ/ درد

مسلل پیٹ میں مروڑ/ درد ہو جو کہ دوا، آرام یا گرم سیکانی سے بھی دور نہ ہو رہا ہو۔




بخار

بخار جو ایک دن سے زیادہ رہے یا بائزوپروسٹول لینے کے اگلے دن سے کسی بھی دن شروع ہو۔ محسوس ہو کہ طبیعت بہت خراب ہے، تھکن اور سستی (وجائنا) سے معمول سے ہٹ کے یا بدبودار مواد کا اخراج اور/یا پیٹ میں درد ہو۔

## میرے لئے مانع حمل کا بہترین طریقہ کیا ہے؟

نامکمل اسقاط حمل کے علاج کے بعد آپ 10 دنوں میں دوبارہ حاملہ ہو سکتی ہیں۔ اگر آپ مانع حمل چاہتی ہیں تو حمل روکنے کا کوئی طریقہ فوراً شروع کریں۔ آپ زیادہ تر مانع حمل کے طریقے مائٹروپروسٹول کی گولیاں لینے کے ساتھ ہی شروع کر سکتی ہیں۔



## مجھے دوبارہ کب معائنہ کیلئے آنا چاہئے؟



عام طور پر دوبارہ آنے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن اگر کچھ خطرناک علامات ظاہر ہوتی ہیں یا آپ کچھ اور مسائل پر بات کرنا چاہتی ہیں تو کسی بھی وقت آ سکتی ہیں۔

اگر آپ جاننا چاہتی ہیں کہ مائٹروپروسٹول کی گولیوں کے ذریعہ بچہ دانی کی صفائی کا عمل کامیاب رہا تو معائنہ کیلئے دو ہفتے بعد آ سکتی ہیں۔

دوبارہ معائنہ (فالو اپ)

تاریخ:

.....

جگہ:

.....

وقت:

..... فون: .....