

میزوپروسٹول (S.T.Mom)





میزوپروسٹول (S.T.Mom)

بچے کی پیدائش کے فوراً بعد ایس ٹی موم استعمال کریں۔ ماں کی جان بچائیں

ماؤں کے مرنے کی سب سے بڑی وجہ بچے کی پیدائش کے بعد خون کا نارمل سے زیادہ ضائع ہونا ہے

S.T.Mom وہ دوا ہے جو زچگی کے بعد زیادہ خون ضائع ہونے کو روک سکتی ہے
جس سے ماں کی جان بچ سکتی ہے

بچے کی پیدائش سے پہلے حاملہ S.T. Mom
کی گولیاں ہرگز استعمال نہ کرے









S.T. Mom کی گولیاں پہلے سے خرید کر زچگی کے وقت قریب رکھیں





بچے کی پیدائش کے فوراً بعد ماں کے پیٹ کا معائنہ کریں اور اطمینان کر لیں کہ پیٹ میں دوسرا بچہ تو نہیں





اگر دوسرا بچہ پیٹ میں نہ ہو تو ماں کو فوراً S.T.Mom کی 3 گولیاں کھلا دیں
گولیاں کھانے کے لئے ناٹوکاٹنے یا آنول کے باہر آنے کا انتظار نہ کریں



خبردار



ہسپتال میں ڈاکٹر یا ڈوائف ماں کی جان بچانے کے لئے اور خون روکنے کے لئے علاج کریں گے



اگر S.T.Mom کی گولیاں کھانے کے بعد بھی بہت زیادہ خون جاری رہے یعنی خون جذب کرنے کے لئے جو کپڑا رکھا ہو وہ مکمل طور پر خون سے تر ہو جائے تو ماں کو S.T.Mom کی 4 گولیاں اور کھلا کر فوراً ہسپتال لے جائیں



S.T.Mom کی گولیاں کھانے کی وجہ سے عام طور پر ظاہر ہونے والے ضمنی اثرات خود بخود چند گھنٹوں میں ٹھیک ہو جاتے ہیں

اگر گولیاں کھانے کے کچھ دیر بعد:






جاڑا لگ رہا ہو یا کپکپی ہو تو:
- کمبل یا رضائی عورت کے اوپر ڈال دیں

بخار ہو تو:

- کپڑے کو پانی سے بھگو کر ماتھے پر پٹیاں رکھیں
- دو گولیاں Paracetamol کی کھلا دیں







اگر جاڑا اور بخار 24 گھنٹے تک رہے تو ماں کو علاج کے لئے صحت مرکز لے جائیں

